RGC-936
(ग्वार बीज)

बीज दर :- 5 से 6 किग्रा प्रति एकड़

बुवाई का समय :- 15 जून से 15 जुलाई तक

दूरी : कतार से कतार 40-45 सेमी., पौधे से पौधे 10-15 सेमी.

भूमि की तैयारी :- भूमि को 2-3 बार गहरी जुताई कर पाटा लगाकर समतल कर लेवें।

भूमि प्रकार :- लवणीय व क्षारीय न हो। चिकनी मिट्टी अधिक न हो।

उर्वरक प्रबंधन : डीएपी 35 किग्रा प्रति एकड़
जिंक 33% 5 किग्राा प्रति एकड़
पोटाश 20 किग्रा प्रति एकड़

बारानी भूमि के लिए उपरोक्त खाद की आधी मात्रा का प्रयोग करें।

बीज उपचार :- 1.5-2 ग्राम बाविस्टिन (कार्बेडाजिम 50% wp) प्रति किलो बीज दर से।

झुलसा रोग (पीला अवस्था) :- कॉपर ऑक्सीक्लोराईड 50% WP 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।

कीट : काला चेपा, हरा तेला नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8% का 1 मिली. प्रति लीटर पानी की दर से या 300 एमएल रोगोर, 100 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।

सिंचाई : दो से तीन पानी की आश्यकता होती है। सिंचाई के बाद वायु संचार के लिए गोढ़ी या हेरो करें।

कटाई :- पकाव 90 से 100 दिन में हो जाता है 85% फलियां पकने पर कटाई शुरू कर देवें। कटी हुई फसल को खेत में कुछ दिनों तक शुष्क होने के लिए छोड़ देवें।

चेतावनी :- उपरोक्त सुझाई गई विधियां कम्पनी के अनुसंधान केन्द्रों पर लिए गए परीक्षणों पर आधारित है इसमें स्थान व पर्यावरण के अनुसार बदलाव संभव है। अच्छी फसल की प्राप्ति के सम्बंध में मार्गदर्शन के लिए निकटतम राज्य कृषि विश्वविद्यालय / कृषि विज्ञान केन्द्र / निकटवर्ती कृषि अधिकारी से सलाह लें।

निर्माता एवं विपणनकर्ता :

जय शंकर सीड्स प्रा. लि.

E-176, फेज फर्स्ट, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया
श्रीगंगानगर - 335002 (राजस्थान)

RGC-936
(ਗਵਾਰ ਬੀਜ)

ਬੀਜ ਦੀ ਦਰ :- 5 ਤੋ 6 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ

ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ :- 15 ਜੂਨ ਤੋ 15 ਜੁਲਾਈ

ਦੂਰੀ :- ਕਤਾਰ ਤੋ ਕਤਾਰ 40-45 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪੌਦੇ ਤੋ ਪੌਦੇ ਦੀ ਦੂਰੀ 10-15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ।

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ :- ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਡੂੰਘਾ ਵਾਹੋ ਅਤੇ ਹੈਰੋ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪੱਧਰ ਕਰੋ।

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ :- ਚੰਗੀ ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਦੋਮਟ ਮਿੱਟੀ ਸਭ ਤੋ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸੋਰੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਖਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ:

ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇ :- ਡੀਏਪੀ 35 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ
ਜ਼ਿੰਕ 33% 6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਏਕੜ
ਪੋਟਾਸ਼ 20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ

ਬਰਸਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਖਾਦ ਦੀ ਅੱਧੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰੋ।

ਬੀਜ ਉਪਚਾਰ :- 1.5-2 ਗ੍ਰਾਮ ਬਾਵਿਸਟਿਨ (ਕਾਰਬੇਂਡਾਜ਼ਿਮ 50% ਡਬਲਯੂਪੀ) ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਬੀਜ।

ਬਿਮਾਰੀ :- ਝੁਲਸ ਰੋਗ (ਪੀਲੀ ਅਵਸਥਾ) ਕਾਪਰ ਆਕਸੀਕਲੋਰਾਈਡ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪਾਓ ਅਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਹਰਾਓ।

ਕੀੜੇ : ਕਾਲੇ ਐਫੀਡ ਅਤੇ ਹਰੇ ਐਫੀਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮੀਡਾਕਲੋਪ੍ਰੀਡ @ 1 ਮਿ.ਲੀ. ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਜਾਂ 300 ਮਿ.ਲੀ. ਰੋਗਰ ਨੂੰ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਪਰੇ ਕਰੋ।

ਸਿੰਚਾਈ : ਦੋ ਤੋ ਤਿੰਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹਵਾਦਾਰੀ ਲਈ ਗੋਡੀ ਜਾਂ ਹੈਰੋ ਕਰੋ।

ਵਾਢੀ : ਪੱਕਣਾ 90 ਤੋ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 85% ਫਲੀਆਂ ਪੱਕਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਕਟਾਈ ਸੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ।

ਸਾਵਧਾਨੀ :- ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰੀਖਣਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਗਿਆਿਨ ਕੇਂਦਰ/ਨੇੜਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ :

ਜੈ ਸੰਕਰ ਸੀਡਸ ਪ੍ਰਾ. ਲਿ.

E-176, ਫੇਜ਼-1st, RIICO ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ
ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ - 335002, ਰਾਜਸਥਾਨ