



## HG-563 (ग्वार बीज)

बीज दर :- 5 से 6 किग्रा प्रति एकड़

बुवाई का समय :- 15 जून से 15 जुलाई

दूरी : कतार से कतार 40-45 सेमी., पौधे से पौधे 10-15 सेमी.

भूमि की तैयारी :- भूमि को 2-3 बार गहरी जुताई कर पाटा लगाकर समतल कर लें।

भूमि प्रकार :- लवणीय व क्षारीय न हो। चिकनी मिट्टी अधिक न हो।

उर्वरक प्रबंधन :

बुवाई का समय :- डीएपी 35 किग्रा प्रति एकड़

जिंक 33% 6 किग्रा प्रति एकड़

पोटाश 20 किग्रा प्रति एकड़

बरानी भूमि के लिए उपरोक्त खाद की आधी मात्रा का प्रयोग करें।

बीज उपचार :- 1.5-2 ग्राम बाविस्टिन ( कार्बेन्डाजिम 50% wp ) प्रति किलो बीज दर से।

रोग :- झुलसा रोग ( पीला अवस्था ) कॉपर ऑक्सीक्लोराईड 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से करें व 10 दिनों के बाद पुनः करें।

कीट : काला चेपा, हरा तेला नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिली. प्रति लीटर के हिसाब से या 300 एमएल रोगोर, 100 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।

सिंचाई : दो से तीन पानी की आवश्यकता होती है। सिंचाई के बाद वायु संचार के लिए गोढ़ी या हेरो करें।

कटाई :- पकाव 90 से 100 दिन में हो जाता है 85% फलियां पकने पर कटाई शुरू कर दें। कटी हुई फसल को खेत में कुछ दिनों तक सुखने के लिए छोड़ दें।

चेतावनी :- उपरोक्त सुझाई गई विधियां कम्पनी के अनुसंधान केंद्रों पर लिए गए परीक्षणों पर आधारित हैं इसमें स्थान व पर्यावरण के अनुसार बदलाव संभव है। अच्छी फसल की प्राप्ति के सम्बंध में मार्गदर्शन के लिए निकटतम राज्य कृषि विश्वविद्यालय / कृषि विज्ञान केंद्र / निकटवर्ती कृषि अधिकारी से सलाह लें।

निर्माता एवं विपणनकर्ता :

### जय शंकर सीड्स प्रा. लि.

E-176, फेज फस्ट, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया

श्रीगंगानगर - 335002 ( राजस्थान )



## HG-563 (ग्वार बीज)

बीज की दर : 5 से 6 किलो प्डी ऐकड़

बिजाई का समां :- 15 जून से 15 जुलाई

दूरी : कतार से कतार 40-45 मैटीमीटर पेंदे से पेंदे की दूरी 10-15 मैटीमीटर।

जमीन की तैयारी :- जमीन नूँ 2-3 वार वारो पॅणर करो

मिंटी की किसम :- चंगी जल निकास वाली दोमट मिंटी सभ से वपीआ है पर एग बहुरत जिआदा सेरे वाली नही होनी चाहीदी।

धाद प्बंधन:

बिजाई के समां :- डीएपी 35 किलोग्राम प्डी ऐकड़

जिंक 33% 6 किलोग्राम/ऐकड़

पोटाश 20 किलोग्राम प्डी ऐकड़

बतरसाती जमीन लई उॅपर दॅसी गदी धाद की अॅपी मातरा की वरते करो।

बीज उॅपचार:- 1.5-2 ग्राम बाविस्टिन (कार्बेन्डाजिम 50% डबलपूपी) प्डी किलो बीज।

बिमाती:- झुलस रोग (पीली अवस्था) कापर आक्सीक्लोराईड 2.5 ग्राम प्डी लीटर पाणी की दर नाल पाँ असे 10 दिनं बाअद दहराँ।

कीसे : काले अैवीड असे हरे अैवीड नूँ कॅटरेल करन लई इमिडाक्लोप्रीड @ 1 मि.ली. प्डी लीटर जां 300 मि.ली. रोगर नूँ 100 लीटर पाणी विँच मिला के सपर करो।

सिंचाई : दो से तिन पाणीं की लेंड हुँदी है। सिंचाई से बाअद हवादारी लई गेडी जां हेरे करो।

वादी : पॅकटा 90 से 100 दिनं विँच हुँदा है। 85% फलीं पॅकट से बाअद कटाई सुरु हो जाँदी है। कॅटी होई फसल नूँ कुँड दिनं लई खेत विँच सुँकट लई ढॅड दिँ।

सावधानी :- उॅपरकृत सुझाँ गदे तरीके कॅपनी के खेज केदरां से कीसे गदे पतीखटां से अणारत हन असे सभान असे वातावरण के आणार से वॅध-वॅध हो सकदे हन। चंगी फसल पुरापत करन लई मारगदरसुन लई, आपणे नजदीकी राज खेतीबाडी जूनीवरसिटी/खेतीबाडी वगिआन केदर/नेडले खेतीबाडी अपिकारी नाल सलाह करो।

निरमाता असे मारकित :

### जे सँकर सीड्स प्रा. लि.

E-176, फेज-1st, RIICO इँडसटरीअल ऐरीआ

श्री गंगानगर - 335002, राजसभान