



MH-421

(ਮੂੰਗ ਬੀਜ)

ਭੂਮਿ ਆਂ ਖੇਤ ਕੀ ਤੈਯਾਰੀ :- ਮੂੰਗ ਕੇ ਲਿਏ ਗਹਰੀ ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਯੁਕਤ ਢੋਮਟ ਯਾ ਹਲਕੀ ਸਿਟਟੀ ਅਢਿਕ ਤਪਯੁਕਤ ਰਹੁਤੀ ਹੈ। ਭੂਮਿ ਲਕਯਣੀਯ ਆਂ ਖ਼ਸ਼ਾਰੀਯ ਨਹੀਂ ਹੋਨੀ ਚਾਹਿਏ। 2-3 ਜੁਤਾਏਂ, ਪਾਟਾ ਲਗਾਕਰ ਖ਼ੁਰਖ਼ੁਰੀ ਆਂ ਸਮਤਲ ਭੂਮਿ ਤੈਯਾਰ ਕਰੋਂ।

ਬੁਵਾਏਂ ਕਾ ਸਮਯ :- ਖ਼ਰੀਫ ਮੂੰਗ 15 ਜੂਨ - 15 ਜੁਲਾਏਂ, ਪਛੇਤੀ ਬਿਜਾਏਂ 20 ਜੁਲਾਏਂ ਤਕ।

ਜਾਯਦ ਮੂੰਗ 1 ਮਾਰਚ - 30 ਮਾਰਚ ਤਕ, ਪਛੇਤੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ।

ਬੀਜ ਕੀ ਮਾਤਰਾ ਆਂ ਦੂਰੀ :-

ਬੀਜ ਦਰ :- ਖ਼ਰੀਫ 6-7 ਕਿਗਰਾ ਪ੍ਰਤਿ ਆਕੜ/ਜਾਯਦ 10-12 ਕਿਗਰਾ ਪ੍ਰਤਿ ਆਕੜ।

ਪੱਕਿ ਸੇ ਪੱਕਿ ਕੀ ਦੂਰੀ :- ਖ਼ਰੀਫ 30-40 ਸੇਮੀ/ਜਾਯਦ 25-30 ਸੇਮੀ।

ਤਰਕਰਕੋਂ ਕੀ ਮਾਤਰਾ ਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗ :-

ਨਾਏਟ੍ਰੋਜਨ - 8 ਕਿਗਰਾ ਪ੍ਰਤਿ ਆਕੜ, ਫਾਸਫ਼ੋਰਸ - 15 ਕਿਗਰਾ ਪ੍ਰਤਿ ਆਕੜ ਬੁਵਾਏਂ ਸੇ ਪੂਰਵ ਡਿਲ ਕਰੋਂ, ਬੁਵਾਏਂ ਸੇ ਪੂਰਵ ਜਿਪਸਮ 55 ਕਿਗਰਾ ਪ੍ਰਤਿ ਆਕੜ ਡਿਲ ਕਰਨੇ ਪਰ ਤਪਜ ਮੇਂ ਵ੍ਰੁਢਿ ਹੋਤੀ ਹੈ।

(ਡੀ.ਏ.ਪੀ. : 35 ਕਿਗਰਾ ਪ੍ਰਤਿ ਆਕੜ ਅਥਵਾ ਆਸਏਸਪੀ :- 100 ਕਿਗਰਾ ਪ੍ਰਤਿ ਆਕੜ ਆਂ ਯੂਰਿਯਾ 18 ਕਿਗਰਾ ਪ੍ਰਤਿ ਆਕੜ)

ਬੀਜ ਤਪਚਾਰ :- ਬੁਵਾਏਂ ਸੇ ਪੂਰਵ ਬੀਜ ਕੋ ਥਾਯਰਮ ਯਾ ਕੇਪਟਾਨ 3 ਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤਿ ਕਿਗਰਾ ਬੀਜ ਕੀ ਦਰ ਸੇ ਤਪਚਾਰਿਤ ਕਰੋਂ।

ਸਿੰਚਾਏਂ :- ਮੂੰਗ ਕੀ ਫਸਲ ਕੋ ਮੁਖ਼ਯਤ: 2-3 ਸਿੰਚਾਏਂ ਕੀ ਆਵਸ਼ਯਕਤਾ ਹੋਤੀ ਹੈ।

ਕੀਟ ਆਂ ਰੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ :- ਪੀਲਾ ਮੋਜੇਕ ਰੋਗ ਕੇ ਵਿ਷ਾਣੂਆਂ ਕੋ ਫਸਲ ਮੇਂ ਫੈਲਾਨੇ ਵਾਲੇ ਤਥਾ ਰਸ ਚੂਸਨੇ ਵਾਲੇ ਕੀਟੋਂ ਕੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇ ਲਿਏ ਡਾਯਮੇਥੋਏਟ (ਰੋਗੋਰ 30 ਏਸੀ) 2.5 ਆਮਏਲ ਪ੍ਰਤਿ ਲੀਟਰ ਕੀ ਦਰ ਪਾਨੀ ਮੇਂ ਮਿਲਾਕਰ ਛਿੜਕਾਵ ਕਰੋਂ।

ਫਲੀ ਛੇਦਕ :- ਏਸ ਕੀਟ ਕੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇ ਲਿਏ ਫੂਲ-ਫਲੀ ਆਨੇ ਪਰ ਕਯੂਨਾਲਫੋਸ 25% ਏ.ਸੀ. ਅਥਵਾ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਟੋਫੋਸ 36% ਆਸ.ਏਲ. ਕਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋਂ।

ਕਟਾਏਂ :- ਮੂੰਗ ਕੀ ਫਲਿਯੋਂ ਕੋ ਪਕਨੇ ਕੇ ਤੁਰਨਤ ਬਾਦ ਕਟਾਏਂ ਕਰ ਲੇਨੀ ਚਾਹਿਏ। ਅਨਯਥਾ ਦਾਨੇ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈ।

ਫਸਲ ਅਵਢਿ :- 60 ਸੇ 70 ਦਿਨ (ਅਨੁਕੂਲ ਮੌਸਮ ਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤਿਯੋਂ ਮੇਂ)

ਚੇਤਾਵਨੀ :- ਤਪਰੋਕਤ ਸੁਝਾਏਂ ਗਏਂ ਵਿਢਿਯਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕੇ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਕੇਂਡ੍ਰੋਂ ਪਰ ਲਿਏ ਗਏਂ ਪਰੀਖ਼ਣਾਓਂ ਪਰ ਆਢਾਰਿਤ ਹੈ ਏਸਮੇਂ ਸਥਾਨ ਵ ਪਰਯਾਵਰਣ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾਵ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਚਛੀ ਫਸਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਿਤ ਕੇ ਸੰਭਵ ਮੇਂ ਮਾਰਗਦਸ਼ਨ ਕੇ ਲਿਏ ਨਿਕਟਤਮ ਰਾਜਯ ਕ੍ਰੁ਷ਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਢਾਲਯ / ਕ੍ਰੁ਷ਿ ਵਿਜ਼ਾਨ ਕੇਂਡ੍ਰ / ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਕ੍ਰੁ਷ਿ ਅਢਿਕਾਰੀ ਸੇ ਸਲਾਹ ਲੋਂ।

ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਂ ਵਿਪਣਨਕਰਤਾ :

ਜਯ ਸ਼ਾਂਕਰ ਸੀਡਸ ਪ੍ਰਾ. ਲਿ.

E-176, ਫੇਜ ਫਸਟ, ਰਿਕੋ ਏਂਡਸਟ੍ਰੀਯਲ ਏਰਿਯਾ
ਸ਼੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ - 335002 (ਰਾਜਸਥਾਨ)



MH-421

(ਮੂੰਗ ਬੀਜ)

ਸਿੱਟੀ ਆਂ ਖੇਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ :- ਮੂੰਗ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਢੋਮਟ ਜਾਂ ਹਲਕੀ ਸਿੱਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਟੀ ਸੇਰੇ ਆਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹਿਦੀ ਸਿੱਟੀ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਵਾਹੋ ਆਂ ਲੈਵਲਰ ਨਾਲ ਪੱਧਰ ਕਰੋਂ।

ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ :- ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੂੰਗੀ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਦੇਰ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ।

ਜੈਦ ਮੂੰਗ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 30 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੇਰ ਨਾਲ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ।

ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਆਂ ਦੂਰੀ :-

ਬੀਜ ਦਰ :- ਸਾਉਣੀ 6-7 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ/ਜੈਦ 10-12 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ।

ਕਤਾਰ ਤੋਂ ਕਤਾਰ ਦਾ ਵਿੱਥ :- ਸਾਉਣੀ 30-40 ਸੈਮੀ. / ਜੈਦ 25-30 ਸੈਮੀ.।

ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਆਂ ਵਰਤੋਂ :-

ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ - 8 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਫਾਸਫੋਰਸ 15 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਿੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਪਸਮ 55 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਿੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (D.A.P. : 35 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਾਂ SSP 100 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਆਂ ਯੂਰੀਆ (18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ)

ਬੀਜ ਉਪਚਾਰ :- ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬੀਰਮ ਜਾਂ ਕੇਪਟਾਨ ਨਾਲ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸੋਧੋ।

ਸਿੰਚਾਈ :- ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 2-3 ਸਿੰਚਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੀਟ ਆਂ ਰੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ :- ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਪੀਲੇ ਮੋਜੇਕ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਆਂ ਰਸ ਚੁਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਾਈਮਿਥੋਏਟ (ਰੋਗਰ 30 ਏਸੀ) ਨੂੰ 2.5 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਪਰੇ ਕਰੋਂ।

ਫਲੀ ਛੇਦਕ :- ਏਸ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਫੁੱਲ ਆਉਣ ਆਂ ਫਲੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਇਨਾਲਫੋਸ 25% ਏਸੀ ਜਾਂ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਟੋਫੋਸ 36% ਆਸਏਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਂ।

ਕਟਾਈ :- ਮੂੰਗੀ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਾਣੇ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਫਸਲ ਦੀ ਮਿਆਦ :- 60 ਤੋਂ 70 ਦਿਨ (ਅਨੁਕੂਲ ਮੌਸਮ ਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ)

ਸਾਵਧਾਨੀ :- ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰੀਖਣਾਂ ਤੋਂ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਆਂ ਸਥਾਨ ਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ/ਨੇੜਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋਂ।

ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਂ ਮਾਰਕਿਟ :-

ਜੈ ਸ਼ਾਂਕਰ ਸੀਡਸ ਪ੍ਰਾ. ਲਿ.

E-176, ਫੇਜ-1st, ਰਿਕੋ ਏਂਡਸਟ੍ਰੀਯਲ ਏਰਿਯਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ - 335002, ਰਾਜਸਥਾਨ